

РОЛЬ ОСИКОВО-БЕРЕЗОВИХ КОЛКІВ У ЗБЕРЕЖЕННІ РІЗНОМАНІТТЯ ҐРУНТІВ І БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

Наведено приклад комплексного підходу до досліджень екологічних особливостей існування острівних лісів (колків) у степовій зоні України. Охарактеризовано основні шляхи ґрунтоутворення, видовий склад флори. Проаналізовано особливості формування герпетобію пісків у мезогігрофільних і гігрофільних умовах другої тераси долини ріки Самари.

The example of complex approach to research of ecological peculiarities of island forests in the steppe zone of Ukraine is presented. Main ways of pedogenesis, plant species composition and forming of the litter invertebrate complex in mesohygrophilous and hygrophilous sandy biogeocenoses of the second terrace of Samara river valley are characterized.

Вступ

Біорізноманіття в Україні постійно зменшується через інтенсивне землеробство та господарську діяльність. Стабільність природних екосистем постійно падає. До 92 % деяких груп земель розорані. Відносне збереження природного різноманіття спостерігається переважно у регіонах, землі яких непридатні для сільськогосподарського виробництва. Тому необхідно напрацювати комплекс специфічних заходів, які дозволять оцінити природне різноманіття на різних рівнях, управляти його змінами.

В умовах степової зони особливої уваги потребує дослідження потенційної лісопридатності територій, що не можуть бути повноцінно використані для створення сільськогосподарської продукції. Дана робота присвячена дослідженню природних лісів піщаної тераси ріки Самара. Знання особливостей умов їх функціонування дозволить використовувати ці специфічні природні біогеоценози для рекультиваци антропогенно порушених земель. Мета роботи – дослідити особливості лісорослинних умов арени ріки Самара, надати характеристику ґрунтів, доміантних видів рослин і безхребетних тварин-герпетобіонтів.

Матеріал і методи досліджень

Геоботанічні дослідження, визначення видів рослин проводили за загальноприйнятими методиками [10]. Увагу зосереджено на ґрунтах зі збільшеним зволоженням у весняно-літній період (улоговини піщаної тераси). Для геоботанічних досліджень взято колки, що відносяться до свіжого та сирого типів місцезростань [4; 5]. Вивчення фауни безхребетних тварин проводили протягом сезону 2002 року у чотирьох осиково-березових колках арени р. Самара з використанням пасток Барбера [1]. Видовий склад доповнений ручним збором безхребетних під рослинними залишками та поблизу води.

Результати та їх обговорення

Бідність мінеральними колоїдами обумовлює рухливість пісків під впливом вітру. Утворюється еоловий рельєф, коли дюни чергуються з улоговинами. У таких улоговинах, як правило, овальної форми, формуються біогеоценози особливого типу – осиково-березові колки. Це динамічні рослинні асоціації, що переносять нестабільний водний

режим. Навесні на дні колків спостерігається присутність води, що зібралась у результаті танення снігу. Звичайно вода висихає до середини літа. Проходячи крізь піщаний ґрунт, вода виносить на глибину розчинені органічні сполуки. У результаті ґрунт профарбовується у буруватий колір і набуває слабкокислої реакції. На дні, у найбільш зволоженому місці, утворюється осокове болото або волога лука з гігро- та мезофітами.

При більш глибокому заляганні ґрунтових вод утворюються умови для зростання молодняків берези та осини. Самозасівні сходи розташовані “латками” різної площі. Часто після енергійного росту та досягнення висоти близько 2 м молодняк відмирає. Причина цього – мінливий водний режим. За нашими даними [9], глибина проникнення органічної речовини по профілю найбільша на дні колка. Вище по “стінах” колка гумусований горизонт різко скорочується (15–20 см завтовшки); у верхній частині він досягає лише декількох сантиметрів. У застійних умовах дна колка відбувається консервація органічної речовини та утворюється торфоподібний горизонт. В умовах арени результатом ґрунтоутворення є ґрунти дерено-борового та дерено-болотного ряду автоморфного та гідроморфного (за наявності прісних ґрунтових вод) типів ґрунтоутворення. Осиково-березові колки важливі як асоціації, що зростають там, де інші форми деревних біогеоценозів не можуть існувати. Сформовані ґрунтові комбінації розмежовуються за ступенем еродованості рельєфу.

До першої групи входять ґрунти, що формуються на потужних пісках із промивним типом водного режиму та домінуванням окисних умов. Тут переважають аеробні процеси. Ґрунтовий профіль безструктурний пухкий, у сухому стані сипкий. Гумусований шар має невелику потужність, різко переходить у материнську породу – пісок.

Для другої групи ґрунтів у нижній частині профілю навесні характерне тимчасове перезволоження із короткочасним переважанням відновних процесів і наступною зміною їх окисними. Подібний тип ґрунтоутворення характерний для улоговин із глибиною залягання ґрунтових вод близько 3 м від поверхні.

Ґрунти третьої групи мають у більшості випадків надлишкове зволоження та випітний тип водного режиму протягом усього вегетаційного періоду. Тут переважають анаеробні процеси. Зміна відновного процесу на окисний відбувається в літньо-осінній період тільки у верхній частині профілю. По профілю ґрунту присутні сірі, сизо-бурі плями, що свідчать про процес оглеєння. Такий тип ґрунтоутворення притаманний ґрунтам осиково-березових колків із високим рівнем стояння ґрунтових вод. У вологі роки капілярна кайма підходить майже до поверхні. Нестабільний гідрологічний режим призводить до формування ґрунтів із диференційованим за елювіально-ілювіальним типом профілем.

Екологічна характеристика рослинності та ґрунтів колків свіжуватого типу місцезростання. Оточення – дубо-сосняк із сухуватим різнотрав'ям типу B_1 . Діаметр колка – 70 м. Перша третина – найнижча позиція – центральна лука, вкрита мезофітами та мезогігрофітами. Проективне покриття – 10–15 %. Із трав'янистих рослин переважають *Carex contigua* L., *Polygonum amphibium* L., *Tanacetum vulgare* L. Друга третина – “кільце” з берези та осики. Проективне покриття травостою – 1–3 % (одичні екземпляри *Convallaria majalis* L. та *Geum urbanum* L.).

Морфологічна характеристика ґрунтового профілю:

H_0	0–2 см	напіврозкладена підстилка з листя берези та осики;
H_p	2–10 см	пухкопіщаний, свіжуватий горизонт, насичений корінням деревних порід;
P_h	10–40 см	пухкопіщаний, безструктурний, свіжуватий горизонт, світло-сірий, перехід поступовий;
P_1	40–50 см	пухкопіщаний, вологий горизонт, із краплинами окисів заліза;
P_2	50–100 см	добре відмитий пісок білого кольору.

Екологічна характеристика рослинності та ґрунтів колків вологих місцевостань. Осиково-березовий колок, розташований на межі заплави та арени. Діаметр – 120 м. Перша третина колка (центр) – галявина шириною 20 м. Проективне покриття трав'яного ярусу – 30 %: *Pteridium aquilinum* L., *Rubus caesius* L., *Urtica dioica* L., *Aegopodium podagraria* L., *Geum urbanum* L. У південно-східній частині колка, на схилі, що краще прогрівається та освітлюється, зростають *Convallaria majalis* L., *Pteridium aquilinum* L., *Tanacetum vulgare* L. Деревостан другої третини колка має наступну характеристику. Перший ярус: *Betula pendula* Roth., *Populus tremula* L., одиничні екземпляри *Pyrus communis* L. Другий ярус: *Acer campestre* L., *Tilia cordata* L., *Ulmus caprifolia* Rupp., *Acer tataricum* L., *Corylus avellana* L. У травостої – *Stellaria graminea* L., *Convallaria majalis* L., *Pteridium aquilinum* L., *Viola mirabilis* L. Проективне покриття – близько 2 %. Потужний шар опаду (у середньому 4 см товщиною), складений листям деревних порід.

Морфологічна характеристика ґрунтового профілю:

H_0	0–4 см	листяний опад деревних порід;
H_p	4–10 см	пухкопіданий, темно-сірий, свіжуватий горизонт, переплетений корінням;
P_h	10–40 см	пухкопіданий, свіжий, темно-сірий, дуже слабо структурований горизонт, перехід поступовий;
P_1	40–50 см	відмитий, крупнозернистий пісок зі слідами окисів заліза по кореневих ходах;
P_2	50–100 см	свіжий щільний пісок.

Ґрунт колка слід вважати дерено-лучним. Гумусований горизонт малопотужний (близько 30 см), генетичні горизонти виражені слабо, ґрунт безструктурний.

Характерна для осикових колків невисока мінералізація ґрунтових вод (30–200 мг/л, на відміну від засолення ґрунтового розчину, у багатьох заплавних типах лісу до 500–2500 мг/л) є однією з головних причин формування специфічних епігейних фауністичних комплексів. Інший фактор формування герпетобію – значні сезонні та добові коливання мікрокліматичних умов, не властиві для більшості інших типів степових лісів [1; 2; 7; 8]. Під час моніторингових досліджень до пасток Барбера потрапляють переважно еврибіонтні та лісові види, не характерні для певного типу лісу (табл.). Значно збільшується (до 72 видів) перелік безхребетних при використанні інших методів збору, особливо на зволжених ділянках колків. Сезонна динаміка герпетобію у дощові весняний і осінній періоди виявляється у значній льотній міграції безхребетних із цих ділянок (чисельність більшості видів зменшується на порядок). Подібні явища спостерігаються частково й улітку, переважно під час червневих злив.

Таблиця

Чисельність турунів (*Coleoptera*, *Carabidae*) різних варіантів осикових фітоценозів арени р. Самара (особин / 10 пастко-діб)

Вид турунів / Характеристика герпетобію	Осиковий дубняк із яглицею	Осичник із липою та розхідником	Осиково- березовий колок із тонконогом	Осиково- березовий колок із очеретом
1	2	3	4	5
<i>Carabus granulatus</i> Linnaeus, 1758	–	0,058	–	–
<i>C. marginalis</i> Fabricius, 1794	–	0,167	–	0,019
<i>Notiophilus laticollis</i> Chaudoir, 1850	–	–	–	0,019
<i>Bembidion biguttatum</i> (Fabricius, 1779)	–	–	–	0,043
<i>Pterostichus ovoideus</i> (Sturm, 1824)	–	0,035	–	–
<i>P. oblongopunctatus</i> (Fabricius, 1787)	–	0,093	–	0,037
<i>P. niger</i> (Schaller, 1783)	0,227	0,023	–	0,015
<i>P. melanarius</i> (Illiger, 1798)	0,035	–	–	–

1	2	3	4	5
<i>Amara aenea</i> (De Geer, 1774)	–	–	–	0,019
<i>A. communis</i> (Panzer, 1797)	–	–	–	0,017
<i>A. similata</i> (Gyllenhal, 1810)	–	0,019	–	–
<i>Harpalus rufipes</i> (De Geer, 1774)	0,035	0,019	0,036	0,019
<i>H. latus</i> (Linnaeus, 1758)	–	0,023	–	0,019
<i>Badister lacertosus</i> Sturm, 1815	–	0,019	–	–
<i>Licinus depressus</i> (Paykull, 1790)	0,019	0,023	–	–
<i>Panagaeus bipustulatus</i> (Fabricius, 1775)	–	–	–	0,052
<i>P. cruxmajor</i> (Linnaeus, 1758)	–	0,076	–	–
Сумарна чисельність <i>Carabidae</i>	0,316	0,555	0,036	0,257
Кількість видів турунів	4	12	1	11

Осиково-березові колки – своєрідні рефугіуми, на території яких більшість лісових видів безхребетних переживає тривалу літню посуху. У цей період у різних стаціях колків формуються специфічні трофічні ланцюги, не характерні для інших типів лісу. “Місцева” фауна примушена конкурувати з великою кількістю неспецифічних для даних умов видів. Тому серед характерних для цих типів лісу видів переважають рідкісні гігрофільні та мезогігрофільні види (*Badister dorsiger* (Duftschmid, 1812), *B. sodalis* (Duftschmid, 1812) та ін.); специфічні мезофільні види відсутні.

Висновки

В умовах улоговин арен степових річок формуються осиково-березові колки – рослинні асоціації, що пристосовані до існування на піщаних ґрунтах із нестабільним водним режимом. У цих умовах домінують рослини-сильванти (*Viola mirabilis* L., *Convallaria majalis* L., *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.). Герпетобій осиково-березових біогеоценозів ариї ріки Самари являє собою бореально-неморальний фауністичний комплекс. Окрім евритопних лісових видів тут також поширені рідкісні гігрофільні та мезогігрофільні види, що збереглися на території степової зони лише в даному типі лісових екосистем.

Бібліографічні посилання

1. Апостолов Л. Г. Вредная энтомофауна лесных биogeоценозов Центрального Приднепровья. – К: Вища школа, 1981. – 232 с.
2. Апостолов Л. Г. Биотопическое распределение муравьев в лесах Присамарья / Л. Г. Апостолов, В. Е. Лиховидов // Вопросы степного лесоведения и охраны природы. – Д.: ДГУ, 1976. – Вып. 6. – С. 139–145.
3. Белова Н. А. Естественные леса и степные почвы / Н. А. Белова, А. П. Травлев. – Д.: ДГУ, 1999. – 348 с.
4. Бельгард А. Л. Лесная растительность юго-востока УССР. – К.: КГУ, 1950. – 263 с.
5. Бельгард А. Л. Степное лесоведение. – М.: Лесная промышленность, 1971. – 336 с.
6. Высоккий Г. Н. О борových типах Чугуево-Бобчанского лесничества вблизи Харькова. Очерки по фитоценологии и фитогеографии. – Л., 1929. – 138 с.
7. Грицан Ю. И. Экокриогенный аспект педоклимата степных эдафотопов // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2002. – Вип. 10, т. 1. – С. 10–18.
8. Кришталь О. П. Энтомофауна ґрунту та підстилки в долині середньої течії р. Дніпро. – К.: КДУ, 1956. – 423 с.
9. Лоза И. М. Развитие идей А. Л. Бельгарда об экологических особенностях колковых биogeоценозов в степи // Екологія та ноосферологія. – 1999. – Т. 6, № 1–2. – С. 63–69.
10. Сукачев В. Н. Методические указания к изучению типов леса / В. Н. Сукачев, С. В. Зонн. – М., 1961. – 104 с.

Надійшла до редколегії 12.11.2006